

MyCARE

With me, every step of the way



“ ഹൈപ്പോൾഗൈസീമിയ
ആണെങ്കിൽ, ഉടൻടി ചികിത്സ
ആരംഭിക്കേണ്ടതാണ് ”



ഈ

15-15

ചികിത്സ പദ്ധതി

പാലിച്ചാൽ മതി

ക്രമം 1

15ഗ്രാം ഭൂതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന
കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കഴിക്കുക



15ഗ്രാം കാർബൊഹൈഡ്രേറ്റ് എന്നാൽ
ഏകദേശം 3 ടീസ്പൂൺ
പഞ്ചസാര / ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ
ഏകദേശം 4 ഗ്ലൂക്കോസ് ഗുളികകൾ




ക്രമം 2

15 മിനിറ്റ് കാത്തിരിക്കുക,
ശേഷം ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് അളവ്
വീണ്ടും പരിശോധിക്കുക




എന്നിട്ടും ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് അളവ്
<70 mg/dL ആണെങ്കിൽ,
അതേ ചികിത്സ തുടരുക.



ഓർമിക്കേണ്ടതായ ചില പ്രധാന മുൻകരുതലുകൾ



ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ വീണ്ടും വരുന്നത് ഒഴിവാക്കുവാൻ, ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് അളവ് $>70 \text{ mg/dL}$ ഉള്ളപ്പോൾ നട്ട്സിനൊപ്പം പഴങ്ങൾ, പനീർ / എഗ് റാപ്പ് എന്നിവ പോലുള്ള ഒരു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഒപ്പം പ്രോട്ടീൻ-സമൃദ്ധ ലഘുഭക്ഷണം/ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക..




ഐസ് ക്രീംസ്, ചോക്കലേറ്റ്സ്, ഇന്ത്യൻ
സ്പീറ്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്സേർട്ട്സ്
പോലുള്ള **ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട്**
ഒരിക്കലും ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയയെ
നികത്തരുത് കാരണം ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ്
അളവുകൾ ഉയർത്തുന്നതിന് അവ
സമയമെടുക്കും.



ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് കുറഞ്ഞതു മൂലം
നിങ്ങൾക്ക് ബോധക്ഷയം സംഭവിച്ചാൽ,
**വായിലൂടെ എന്തെങ്കിലും നൽകുന്നത്
ഒഴിവാക്കുകയും** ഉടനെ ഏറ്റവുമടുത്ത
ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയും
ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾ
അല്ലെങ്കിൽ പരിചരിക്കുന്നവരോട്
പറയുക.




പകരമായി, കടുത്ത
ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയയെ
ചികിത്സിക്കുന്നതിന് **ഗ്ലൂക്കഗോൺ**
ഇഞ്ചക്ഷൻസ് വീട്ടിൽ
കരുതിവെക്കാം.




കുറിപ്പ്: കടുത്ത വിവരങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കുക.


രാത്രികാല ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ
ഒഴിവാക്കുന്നതിന്, ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ്
അളവുകൾ കിടക്കാൻ നേരത്തും
രാവിലെ 3 മണിക്കും
പരിശോധിക്കണമെന്ന്
ഉപദേശിക്കുന്നു.



നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് കുറവ്
അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാനുള്ള
ഉറപ്പായ ഏകമാർഗം, കഴിയുമെങ്കിൽ,
**നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ്
പരിശോധിക്കുകയാണ്.**



നിങ്ങൾക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ
അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ
ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ
നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ്
പരിശോധിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ,
**ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയയെ
ചികിത്സിക്കുക.**



“ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, നിങ്ങളുടെ
ഡോക്ടറെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ
MyCARE ഡയബറ്റിസ്
എജ്യൂക്കേറ്ററെ ബന്ധപ്പെടുക ”



MyCARE

With me, every step of the way

Reference

- Salis S. (2020) Diet in Diabetes Simplified (2nd ed.). Chennai: Notion Press.
- McTavish L, Wiltshire E. Effective treatment of hypoglycemia in children with type 1 diabetes: a randomized controlled clinical trial. *Pediatr Diabetes*. 2011;12(4 Pt 2):381-387.
doi:10.1111/j.1399-5448.2010.00725.x

Issued in Public Interest by



The guide/presentation/content/literature is for general information, guidance and educational purposes only and is not complete or exhaustive. The guide /presentation/content/literature is not intended or implied to replace or substitute any current practice and or advice/guidance/diet provided by healthcare professionals. This guide/presentation/content/literature does not constitute any treatment/therapy/medication/diet/opinions for any patients who are on diabetes medication, the patients are required to prior consult their healthcare professional before acting on any change on treatment/therapy/ medication/diet and/or opinions. USV Private Limited makes no representations as to accuracy, completeness, correctness, suitability or validity of any information contained in this guide/presentation/content/ literature and will not be liable for any losses, injuries or damages arising from its use.

